

4171 - CLOCIO 12X20ML

FÓRMULA:

Cada 100ml contém:

Cloprostenol sódico (equivalente a 25 mg de cloprostenol)..... 26,30 mg

Veículo q.s.p..... 100,00ml

DESCRIÇÃO:

É um análogo sintético da PGF2a, de baixa toxicidade e rápida eliminação pelo organismo. Sua ação dá origem à regressão morfológica do corpo lúteo (luteólise) e consequente queda nas concentrações periféricas de progesterona, seguido por um aumento na secreção de gonadotrofinas e pelo retorno ao cio e a ovulação normal.

INDICAÇÕES:

Bovinos:

Estro não detectável (cio silencioso).

- Em vacas na época do pico de lactação há uma manifestação pobre de cio, apesar da atividade ovariana estar normal. Nestes casos, deve-se avaliar as fêmeas por palpação retal para confirmar a presença de corpo lúteo. Após a confirmação, trata-las com 2ml de clocio e observar o cio antes da inseminação.

- É importante ressaltar que antes de introduzir qualquer animal em um programa reprodutivo deve-se proceder uma avaliação deste animal, principalmente no que se relaciona ao estado corporal e nutricional.

- A eficácia do produto está relacionada a presença de corpo lúteo funcional, portanto o Clocio não deve ser aplicado em animais que estejam antes do 5 dia pós-estro e nem após o 16 dia pós-estro.

Abaixo, dois exemplos de programas que podem ser utilizados:

a) Após realização de exame que comprove a existência de corpo lúteo (palpação retal ou ultrassonografia), aplique uma dose de Clocio e na próxima detecção de cio, proceda a inseminação artificial ou monta natural.

b) Realizar a observação de cio por seis dias consecutivos e aplicar uma dose de Clocio no sexto dia de observação nos animais que não apresentaram cio. No próximo cio, proceda à inseminação artificial ou monta natural.

OBSERVAÇÕES:

Normalmente a resposta a uma única dose de Clocio ocorre até seis dias após a aplicação do produto.

DOSAGEM E MODO DE USAR:

2 mL , equivalente a 500ug via intramuscular.

ATENÇÃO OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

Bovinos: Abate: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 1 dia após a última aplicação.

Leite: Carência zero.

OBS: A utilização do produto em condições diferentes das indicadas nesta bula pode causar a presença de resíduos acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal impróprio para o consumo.

BENEFÍCIOS:

- Alta eficácia: o cloprostenol é um potente agente luteolítico.
- Melhora nos índices reprodutivos.
- Aumento da resposta imune no útero (na presença do corpo Lúteo) e involução uterina.
- Pode ser utilizado em programas de inseminação artificial em tempo fixo.

PRECAUÇÕES:

- O produto não deve ser administrado em fêmeas prenhes.
- O estado nutricional e o manejo inadequado dos animais podem levar a resultados insatisfatórios no uso do produto.
- Mulheres grávidas e pessoas asmáticas não devem manusear este produto.
- Evitar contato direto com a pele e em caso de derramamento acidental, lavar o local com água corrente.
- Durante o tratamento com o produto, não utilizar outro quimioterápico simultaneamente.
- O tratamento quando realizado sob orientação do Médico- Veterinário e na posologia recomendada, não deverá produzir reações adversas.

Efeitos colaterais:

Não possui nas doses indicadas.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos após a data de fabricação. Após a primeira perfuração o produto pode ser utilizado por no máximo 28 dias.

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 1 frasco ampola de 20ml e display contendo 2 ampolas de 2ml cada.