

4277 - DIPLOFOS LEITE 40 ADE - B 25KG

INDICAÇÃO DE USO:

Suplemento vitamínico e mineral de pronto uso para bovinos de leite em várias fases de produção.

COMPOSIÇÃO BÁSICA QUALITATIVA:

Calcário Calcítico, Fosfato Bicálcico, Enxofre Pecuário, Óxido de Magnésio, Cloreto de Sódio (Sal comum 19%), Iodato de Cálcio, Óxido de Manganês, Sulfato de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Cobre, Cromo Orgânico, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Levedura Autolisada de Cana-de-Açúcar (*Saccharomyces cerevisiae*), Aditivo Aromatizante, Biotina, Caulim (máx. 10%), Aditivo Antioxidante e Monensina.

EVENTUAIS SUBSTITUTOS:

Fosfato Monocálcico, Carbonato de Sódio, Sulfato de Manganês, Óxido de Zinco, Óxido de Cobre, Calcário Dolomítico, Vitamina AD3, Sulfato de Magnésio, Iodato de Potássio, Carbonato de cobalto e Virginiamicina.

NÍVEIS DE GARANTIA:

Matéria Mineral (máx.) 920,00 g/kg, Cálcio (mín.) 180,00 g/kg, Cálcio (máx.) 280,00 g/kg, Fósforo (mín.) 40,00 g/kg, Sódio (mín.) 74,00 g/kg, Enxofre (mín.) 16,00 g/kg, Magnésio (mín.) 12,00 g/kg, Cobre (mín.) 606,00 mg/kg, Manganês (mín.) 706,00 mg/kg, Zinco (mín.) 2.022,00 mg/kg, Iodo (mín.) 38,00 mg/kg, Selênio (mín.) 40,00 mg/kg, Cobalto (mín.) 15,00 mg/kg, Vitamina A (mín.) 140.000,00 UI/kg, Vitamina D3 (mín.) 34.000,00 UI/kg, Vitamina E (mín.) 1.000,00 UI/kg, Cromo (mín.) 8,50 mg/kg, Biotina (mín.) 60,00 mg/kg, Flúor (máx.) 750,00 mg/kg.

VALOR DE REFERÊNCIA – VR

GARANTIA	VALOR DE REF. VR1	QUANT. FORNE. 100G DE SUPLE.	QUANT. % VR FORNE. 100G DE SUPLEME.
Consumo de PB (g/dia)	550	-	
-			
Consumo de NDT (g/dia)	4.000	-	-
MACROMINERAIS (g/dia)			
Cálcio	14	21	150,00
Fósforo	11	4	36,36
Sódio	7	7,4	105,71
Magnésio	9	1,2	13,33
Enxofre	13,5	1,6	11,85
Potássio	54	-	-
MICROMINERAIS (mg/dia)			
Cobalto	0,9	1,5	166,66
Cobre	90	60,6	67,33
Iodo	4,5	3,8	84,44
Manganês	180	70,6	39,22
Selênio	0,9	4,0	444,44
Zinco	270	202,2	74,88
Ferro	450	-	-

VITAMINAS

Vitamina A	20.000	14.000	70,00
Vitamina D	2.500	3.400	136,00
Vitamina E	350	100	28,57

Valor diário de referência para manutenção de um animal de 450 kg de peso corporal.

MODO DE USAR:

Adicionar de 40 a 50 kg do produto por tonelada de ração, fornecer à vontade em cocho coberto, consumo estimado de 200 a 450 g por animal/dia ou a critério do Técnico Responsável.

RESTRICÇÕES:

O produto é adequado apenas para o consumo animal: para espécie bovina. CONTÉM IONÓFOROS, NÃO FORNECER A CAVALOS OU OUTROS EQUÍDEOS. A MONENSINA É INCOMPATÍVEL COM ALGUMAS SUBSTÂNCIAS COMO A TIAMULINA.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Recomenda-se manter o produto em local seco e arejado, evitando deixar as embalagens abertas por longo período.