

3716 - CYPERBIO PLUS POUR ON 4X1000ML

FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

Cipermetrina.....	6,0g
Clorpirifós.....	7,0g
Butóxido de Piperonila.....	0,5g
Veículo q.s.p.....	100,0 mL

INDICAÇÕES:

CYPERBIO PLUS Pour On é indicado no controle dos principais ectoparasitas de bovinos e suínos. Contém em sua formulação o Butóxido de Piperonila, que atua como potencializador da Cipermetrina. Controla os seguintes ectoparasitas:

Bovinos: Carrapatos: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Amblyomma cajennense*, *Amblyomma* spp. e *Anocentor nitens*. Bernes: larvas de *Dermatobia hominis*.

Moscas: *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Dermatobia hominis*, *Musca autumnalis*, *Musca* spp., *Tabanus* spp. e *Haematobia irritans* (mosca dos chifres).

Piolhos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* e *Damalinia bovis*.

Sarnas: *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Psoroptes natalensis* e *Chorioptes bovis*.

Suínos: Bernes: larvas de *Dermatobia hominis*.

Moscas: *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Musca* spp., *Haematobia irritans*, *Dermatobia hominis* e *Musca autumnalis*.

Sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *Suis*.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

CYPERBIO PLUS Pour On deve ser aplicado sobre o dorso do animal, iniciando-se do meio do pescoço até a inserção da cauda.

Bovinos: 10mL/100Kg de peso corporal, obedecendo a tabela abaixo:

Peso do Animal	Dose
100Kg	10ml
200Kg	20ml
300Kg	30ml
400Kg	40ml
500Kg	50ml

Para animais acima de 500Kg, a dose máxima recomendada é de 50mL.

Suínos: 5mL/100Kg de peso corporal, obedecendo a tabela abaixo:

Peso do Animal	Dose
50Kg	2,5mL
100Kg	5mL
150Kg	7,5mL
200Kg	10mL
250Kg	12,5mL
300Kg	15mL

INTERVALO ENTRE DOSES:

O intervalo entre as aplicações pode variar de acordo com o programa adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de infestação e taxa de reinfestação do rebanho, ou a critério do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não aplicar em animais recém-nascidos, debilitados, doentes, exaustos, estressados e em fêmeas no terço final de gestação. Não aplicar em pele lesionada. Não aplicar sobre pele úmida, ou quando esta estiver coberta por lama ou fezes. Não aplicar o produto em dias chuvosos ou nas horas de calor intenso. Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto

PRECAUÇÕES:

Manter a embalagem do produto fechada. Não reutilizar as embalagens vazias. Seguir as dosagens recomendadas. Não guardar próximo de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Não fumar, comer ou beber durante a utilização do produto. Lavar as mãos e as partes expostas após a utilização do produto. Não misturar com óleos ou outros pesticidas. Não contaminar rios e outros cursos de água. Produto tóxico para peixes.

REAÇÕES ADVERSAS:

Os piretróides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos. Geralmente são seguros, mas eventualmente podem causar alergia, náusea, vômito e cefaléia. Os organofosforados podem provocar efeitos adversos como salivação, lacrimejamento, micção, defecação, dispnéia, fasciculação, ataxia e convulsões (em casos de má administração de doses ou intoxicação acidental).

No homem: se o produto atingir os olhos do manipulador, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos. Se o produto entrar em contato com a pele, retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão. Se ocorrer intoxicação acidental, procurar imediatamente o Médico, realizar tratamento sintomático e utilizar sulfato de atropina, que é o antídoto de emergência nos casos de intoxicação por organofosforados.

Nos animais: não devem ocorrer intoxicações em bovinos e suínos quando utilizada a posologia recomendada e sob orientação do Médico Veterinário. Em caso de intoxicação, procurar o Médico Veterinário, realizar tratamento sintomático e utilizar sulfato de atropina.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

A utilização simultânea de outros produtos a base de organofosforados e carbamatos deve ser avaliada pelo Médico Veterinário para evitar intoxicações. Inibidores da oxidase de função mista (ex: Butóxido de Piperonila) suprimem a hidrólise de piretrinas e piretróides, potencializando sua atividade. Fármacos que ativam os receptores colinérgicos, relaxantes musculares periféricos e organoclorados devem ser evitados quando se fizer o uso de organofosforados. Os tranquilizantes fenotiazínicos aumentam a toxicidade dos organofosforados. A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

APRESENTAÇÃO:

Frascos contendo 1L.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30 graus, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.